

## PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY - PYELOPLASTIKA

### **Vážená paní, pane, vážení rodiče,**

Tento operační výkon je prováděn u rozšíření ledvinné pánvičky, spojeném s městnáním moče, která bývá často navíc infikována. Toto rozšíření ledvinné pánvičky může být nejčastěji dáno zúžením močového v místě jeho napojení na ledvinnou pánvičku či útlakem močového cévním svazkem nebo vazivovým pruhem. Neléčené rozšíření pánvičky s městnáním moče může vést k zánětům ledviny s těžkými, život ohrožujícími horečnatými stavy, k poruše funkce ledvin a k opakovaným bolestem v bederní krajině.

### **Plastika pánvičky je operační výkon,**

jehož cílem je odstranění vyvolávající příčiny, tedy odstranění překážky v odtoku moče z ledvinné pánvičky do močového. Výkon je prováděn v celkové anestézii /spíte a necítíte žádnou bolest/ v poloze na boku. Řez kůží a podkožím je veden na boku, poté zmenšujeme ledvinnou pánvičku a močovod nově napojujeme na nejnižší místo na pánvičce. Po operaci Vám bude zaveden nefrostomický drén do pánvičky /dočasně odvádí moč z pánvičky za účelem lepšího zhojení / a intubační cévka do močového/ napomáhá modelaci nově vytvořeného napojení močového na pánvičku/. Tyto drény spolu s drénem uloženým k ledvině jsou po operaci vyvedeny přes kůži z těla ven. V pooperačním období Vám budou postupně odstraňovány.

### **K možným komplikacím,**

po operaci patří krvácení do oblasti kolem ledviny či z rány, močová sekrece z rány, kterou lze většinou úspěšně řešit odvedením moči katétrem zavedeným do močového. K pozdním komplikacím patří zúženina močového jako následek jizvení. V tomto případě je pak nutný buď endoskopický výkon na močového, kdy je speciální přístroj s optikou za kontroly zraku lékařem zaveden do močového, nebo operační revize.

## Schéma operace :

