

ODSTRANĚNÍ PROSTATY PRO NÁDOR (RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE)

Vážený pane,

Na základě provedených vyšetření byl u Vás prokázán zhoubný nádor prostaty ohraničený na prostatu. Nádory prostaty jsou relativně pomalu rostoucí nádory. Proto se ze stádia ohraničení na prostatu do stádia rozsetí nádoru do těla (tzv. generalizace) dostává až za zhruba 10 let. Při generalizaci je však již nádor nevléčitelný. Obětí pacienta za možnost prodloužení života v budoucnu je podstoupení operace v době, kdy ještě nemá obtíže a operace pro něj může přinést různé následky. Alternativou k radikální operační léčbě je ozáření, které má však podobné nežádoucí účinky, ale horší léčebné výsledky, nicméně je alternativní metodou léčby.


Operace se provádí v celkové anestézii (narkóze). Je veden řez od pupku až ke kosti stydké. Jsou odebrány vzorky uzlin kolem pánevních cév. Uzliny jsou u hodnoty PSA (prostatický specifický antigen – odráží pokročilost onemocnění) nad 20 ng/ml odesílány na peroperační histologické vyšetření. Obsahují-li nádorové buňky, poté radikální prostatektomie ztrácí smysl, výkon se ukončuje a s pacientem je později dohodnut jiný typ léčby. Vlastní radikální prostatektomie poté spočívá v odstranění celé prostaty včetně jejího pouzdra a semenných váčků. Hrdlo močového měchýře se poté našívá přímo na močovou trubici. Vzhledem k možnosti poranění konečníku Vám bude předoperačně vyprázdněno střevo speciálním roztokem. Po operaci asi dva dny budete dostávat infúzní léčbu („kapačky“) a postupně budete přecházet na normální stravu. Cévka se Vám odstraní 2 až 3 týdny po operaci.

Jaké komplikace přicházejí v úvahu ?

- Krvácení během operace, které si vynutí podávání krevních transfúzí.
- Plných 100% mužů má vymizení výronu semene díky odstranění orgánů, které semeno tvoří.
- Kolem 50% mužů trpí pooperačně dočasně únikem moče (inkontinence), asi 10% poté trvale (zejména při zvýšení nitrobřišním tlaku (např. kašel, zvedání předmětů). Inkontinence moče se řeší vložkami či speciálním kondomovým jímačem na moč, u přetrvávání úniku moče déle než rok je možné voperováním umělého svěrače.
- U minimálně poloviny mužů dojde pooperačně k poruchám erekce. Tyto poruchy je možné léčit podáváním léků ve formě tablet typu Viagra® či Cialis® či u těžších forem poruch erekce pomocí injekcí podávaných přímo do penisu.
- V úvahu přichází samozřejmě celá řada obecných komplikací interních (plicní embolie, trombóza žil dolních končetin, zápal plic), špatné hojení rány (hnisání). Velice zřídka se objevují alergické reakce na použitý materiál, desinfekci, v podobě vyrážky, svědění kůže.

Schéma operace :

1a – stav před operací, 1b – stav po operaci – odstraněna prostata včetně pouzdra, semenné vajíčky, část chámovodů a část hrdla močového měchýře



1a.

1b.